



STATION POITOU-CHARENTES 09002 03013 00097 3096A 06/04/94-14h U

BIBLIOTHEQUE NATIONALE REGIE DEPOT LEGAL PERIODIQUES - SERVICE IMPRIMERIE 58. RUE RICHELIEU

75000 PARIS

Bulletin nº 260 (9/94) du 06 Avril 1994

COLZA

: Traitement maladies

BLE

: Quelle stratégie sur les maladies foliaires ?

COLZA

Stade F (début floraison) à G3 (les dix premières sliiques ont une longueur supérieure à 4 cm).

MALADIES

Situation

Nous confirmons la forte présence du pseudocercosporella. Le temps est favorable à sa montée sur les étages foliaires supérieures et sur les siliques. Les conditions climatiques actuelles risquent d'être favorables au sciérotinia.

Préconisation

Il est urgent de réaliser la protection fongicide. Utiliser un produit efficace sur sciérotinia et pseudocercosporella dans les parcelles à bon potentiel. Dans les situations à faible espérance de rendement ou face à une petite pression de pseudocercosporella, un carbendazime à 500 g peut suffir.

CHARANCONS DES SILIQUES

Situation

Le colza est ou va arriver aux stades sensibles. Le temps est défavorable et va le rester au moins toute la semaine (voir dossier Avertel page 17 pour les exigences thermiques de l'insecte et éviter toute confusion avec le charançon de la tige).

Préconisation

II est trop tôt pour intervenir, les seuils ne sont pas atteints. (Voir Avertel page 17).

PUCERONS CENDRES DU CHOU

Le temps leur est défavorable.

POIS

Stade 2 à 8 feuilles.

SITONES

Situation

Forte activité.

Préconisation

Surveillez les parcelles les plus tardives qui n'ont pas encore reçu de protection. Intervenez dès que vous atteignez la note 2 (voir Avertel page 20). A partir du stade 6 feuilles, tout traitement est inutile.

BLE

Stade 1-2 noeuds.

ROUILLE BRUNE

Situation- Prévision

Des pustules vont apparaître significativement d'ici 15 jours sur la façade maritime ainsi qu'en Centre et Sud Charente. Ailleurs, elle va rester rare. Les symptômes sont toujours discrets pour le moment.

SEPTORIOSE

Situation - Prévision

Le climat de la semaine va être favorable. Une progression des symptômes est à prévoir en tous secteurs. La maladie atteint actuellement jusqu'à la feuille n°3 en partant du haut (future feuille 5). Préconisation

C'est principalement la septoriose qui va détermine la date de votre traitement.

- Potentiels inférieurs à 60 qx/ha : compte tenu de la persistance des triazoles sur septoriose, il est préférable d'attendre pour intervenir.
- Potentiels supérieurs à 60 qx/ha : prévoir la première intervention dès la fin de l'actuelle période pluvieuse.



Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX 13, Rte de la forêt - 86580 BIARD Abonnement annuel: 350 F. Tél.: 49.58.39.02

Publication périodique Directeur Gérant: G.GOARANT CPPAP no. 1664 A.D. ISSN 0294 - 4693

